



FICHES TECHNIQUES VALORISÉES DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET INDUSTRIELLES

La culture du NAVET

ITCMI 2010

	النافث	
	NAVET	
	TURNIP	
Nom botanique	<i>Brassica campestris</i>	
Famille:	Brassicacées	
Plante bisannuelle, cultivée pour sa racine destinée à l'alimentation. Espèce originaire d'Europe orientale		

I - PLANTE

- Nombre de graine au gramme : 400 à 600.
- Longévité moyenne de la graine : 4 - 5 ans
- Température de germination : 5°C
- Cycle végétatif : 40 à 75 jours.

II - STADES PHENOLOGIQUES

- 09 : Stade levée.
10 : Cotylédons étalés ; point végétatif apicale ou initiales des premières vraies feuilles.
13 : 03 feuilles étalées.
43 : Racine, tiges (30 % de leur taille finale).
61 : début de la floraison.
75 : Maturité.



III – VARIETES LES PLUS CULTIVEES EN ALGERIE

De vertus marteau, demi long de Croissy, blanc dur d'hiver...

IV - EXIGENCES

- Aime les sols limoneux et perméables.
- Aime les climats humides et brumeux.
- Peu exigeant en chaleur.
- Craint les gelées.
- Température optimale 16 à 30 °C.
- Sous l'effet de la chaleur et de la sécheresse , le navet monte rapidement en graines et donne des racines creuses filandreuses.
- pH : 5,5 à 6,8.
- Salinité : plante sensible au sel 1,92 à 3,2 g / l (2 à 3 mmhos/ cm⁻¹).

V - ZONES DE PRODUCTION

Dans l'ensemble des régions d'Algérie, la culture peut être conduite en irrigué et en sec pour les navets d'hiver.

VI - MISE EN PLACE DE LA CULTURE

- Labour 20 à 25 cm.
- Reprise vibroculteur herse+ roulage après semis.

6.1- SEMIS

- **Dose** : 4 kg/ ha
- **Période** : toute l'année sauf décembre, Janvier à mars, **à la volée**.

En ligne : graines enrobées (semoir de betterave) 3 kg / Ha

Distances : Entre rangs : 0,15 à 0,30 m

Entre plants : 0,07 m à 0,10 m.

En planche : 20 à 35 graines/ mètre linéaire.



6.2- ENTRETIEN DE LA CULTURE

Désherbage , éclaircissage

6.3- FERTILISATION

- + **Fumure de fond** : Organique : 25 à 30 t / ha fumier bien décomposé.
Minérale : 70 unités de N / ha.
60 à 80 unités de P / ha.
80 à 100 unités de K / ha.
- + **Fumure d'entretien** :
Après éclaircissage 30 unités de N/ ha.
50 unités de K/ ha.



6.4- IRRIGATION

Un manque d'eau provoque un durcissement des racines.

Besoins estimés : **3.500 à 4.000 m³ / ha.**

VII – PROTECTIN SANITAIRE

Mildiou : Mancozebe
Famoxate+ manco

Altise des crucifères :
Cypermethrine
Deltamethrine



Alternariose : Mancozebe
Hydroxyde de cuivre

Mouche du chou :
Cypermethrine



Limace : Son + Alcool

VIII - RECOLTE

70 à 90 jours après le semis. Manuelle pour le marché de frais en bottes ou à racines.

Rendements : 25 à 30 t / ha.

ITCMI

FTV : LA CULTURE DE NAVET D'HIVER (1 HA)
RDT : 200 QX/HA

Opérations	Main d'œuvre			Matériel			Approvisionnement			Total DA
	Nbre J	Coût unitaire	Montant DA	Nbre H	Coût unitaire	Montant DA	quantité	Coût unitaire	Montant DA	
I. Pépinière :										
- Semence	-	-	-	-	-	-	4 kg	2000	8000	8000
S/T	-	-	-	-	-	-	-	-	8000	8000
II. Travaux du sol :										
- Epandage du fumier NPK	0,5	600	300	2	500	1000	4 qx	6000	24000	25300
- Labour	1	600	600	8	500	4000	-	-		4600
- Disquage croisé	0,25	600	150	2	500	1000	-	-		1150
- Hersage + roulage	0,25	600	150	2	500	1000	-	-		1150
S/T	2	-	1200	14	-	7000	-	-	24000	32200
III. Plantation et entretien :										
-Confection des planches	12	600	7200	-	-		-	-		7200
- Semis	2,5	600	1500	-	-		-	-		1500
- Irrigation (aspersion)	4	600	2400	-	-		2000 m3	4	8000	10400
-Fumure couverture	0,5	600	300	-	-		1 ql d'N	6000	6000	6300
-Traitement + produits (insecticide)	2	600	1200	4	500	2000	-	-	15000	132000
S/T	21	-	12600	4	-	2000	-	-	29000	43600
IV. Récolte et transport :										
- Récolte + transport+lavage	20	600	12000	20	500	10000	-	-		25000
S/T	20	-	12000	20	-	10000	-	-		25000
V. Amortissement :										
- Matériel d'irrigation	-	-		-	-		-	-		
S/T	-	-		-	-		-	-		
Total Général	43	-	25800	38	-	19000	-	-	61000	108300